Verhalten bei Impfreaktionen

Anaphylaxie erkennen

↓

Hilfe über den Rettungsdienst anfordern – Nummer: 112

↓

Leitsymptom identifizieren

Juckreiz, Hauterscheinungen, Angioödem	Übelkeit, Koliken, Erbrechen	Dyspnoe, bronchiale Obstruktion	Dysphonie, Uvulaschwellung inspirator. Stridor	Hypotension, Schock (Radialispuls nicht tastbar, Carotispuls tastbar), Bewusstlosigkeit	Herzkreislauf-stillstand

↓

Symptomorientierte Lagerung

↓

Adrenalin i.m. (0,5mg Adrenalin), 4-8l/min Sauerstoff inh.

Kardio-pulmonale Reanimation

AED vorhanden?

↓

Zugang i.v.

↓

β2-Sympa-thomimetikum (z.B. 2-4 Hub Berotec)

Adrenalin inh. 2mg

Adrenalin i.v. 1mg

Atemwegs-sicherung

Sauerstoff 100%

↓

Forcierte Volumensubstitution i.v. 500-1000ml Sterofundin i.v.

↓

Dimetinden i.v. (4-8mg i.v.; z.B. 1-2 Amp. Fenistil)

Kortikosteroid i.v. (z.B. Solu-Decortin H 500mg i.v.)

↓

Basisuntersuchung und Übergabe an den Rettungsdienst

modifiziert nach: Leitlinie (S2k) zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie - Update 2019